



East African Regional External Quality Assessment Scheme (EA-REQAS)

Réponses codées : Enquête S037-2026

Choisissez le ou les codes correspondant à vos réponses ci-dessous. Plusieurs codes peuvent être sélectionnés pour chaque réponse.

CODE	RÉPONSE
CLP000	Réponse ne figurant pas dans la liste (indiquez votre réponse dans l'encadré prévu à cet effet sur la feuille de réponses ou en ligne).
CLP001	Impossible de répondre (indiquez votre motif dans l'encadré prévu à cet effet sur la feuille de réponses ou en ligne).

CODE	RÉPONSE
CLP002	Aucun diagnostic n'a été établi.
CLP003	Aucun traitement spécifique n'est requis.

RÉPONSES DE LABORATOIRE

	Microbiologie/Parasitologie
	Tabouret
LMS001	examen microscopique des selles
LMS002	<i>Shigella</i> spp
LMS003	<i>Ancylostoma duodenale</i>
LMS004	<i>Schistosoma mansoni</i> ovules
LMS005	<i>Campylobacter jejuni</i>
LMS006	<i>Ascaris lumbricoides</i> ovules
LMS007	<i>Salmonella</i> spp
LMS008	<i>Necator americanus</i>
LMS009	Pathogène <i>Escherichia coli</i>
LMS010	Trichuris trichiura ova
LMS011	<i>Vibrio cholerae</i>
LMS012	œufs d' <i>ankylostome</i>
LMS013	Aucun parasite ni anomalie n'a été observé dans les selles.
LMS014	<i>Strongyloides stercoralis</i> ovules
LMS015	<i>Hymenolepis nana</i>

	Urine
LMU001	Examen microscopique des urines
LMU002	Urine pour culture et antibiogramme
LMU003	<i>Trichomonas vaginalis</i>
LMU004	<i>Schistosoma haematobium</i> ovules
LMU005	Aucun organisme observé

	coloration de Gram
LGS001	cocci Gram positifs
LGS002	cocci Gram négatifs
LGS003	bacilles Gram positifs
LGS004	bacilles Gram négatifs
LGS005	Aucun organisme observé

	Autres réponses
LOA001	Globules rouges visibles
LOA002	Aucun globule rouge visible
LOA003	transmission féco-orale
LOA004	Des cellules purulentes ont été observées.
LOA005	Aucune cellule purulente observée
LOA006	Des cellules de levure ont été observées.
LOA007	Des globules blancs ont été observés.

	Expectorations
LTB001	AAFB négatif
LTB002	AAFB positif
LTB003	AAFB positif (1+)
LTB004	AAFB positif (2+)
LTB005	AAFB positif (3+)
LTB006	Soumettre un échantillon d'expectorations pour culture de tuberculose
LTB007	Analyser au moins deux échantillons d'expectorations.
LTB008	L'infection par le VIH est associée à l'infection par la tuberculose.
LTB009	Crachats pour AFB
LTB010	Crachats pour test GeneXpert

	Sérologie
LSY001	Positif/réactif
LSY002	Négatif/non réactif
LSY003	Effectuer un test de dépistage de la syphilis
LSY004	Répéter le test de dépistage de la syphilis à 3, 6, 9, 12 et 24 mois après le traitement
LSY005	Effectuer un test de confirmation de la syphilis
LSY006	Effectuer un test de confirmation de la syphilis après 3 mois
LSY007	Effectuer un test de confirmation de la syphilis après 6 mois
LSY008	Effectuer un test de confirmation de la syphilis après 1 an
LSY009	test de dépistage du VIH
LSY010	Répéter le test VIH après 3 mois
LSY011	Répéter le test VIH après 6 mois
LSY012	Test de confirmation du VIH
LSY013	Confirmer par test ELISA
LSY014	Effectuer un test PCR
LSY015	Aucun test de dépistage du VIH requis
LSY016	Aucun test répété n'est nécessaire.

	Tests supplémentaires
LAT001	Glycémie
LAT002	Analyse d'urine pour le glucose
LAT003	Analyse d'urine pour la recherche de protéines
LAT004	Analyse d'urine pour la bilirubine
LAT005	Numération formule sanguine complète / hémogramme
LAT006	Examen du frottis sanguin périphérique
LAT007	test de dépistage de la drépanocytose
LAT008	Prélèvement vaginal haut (HVS)
LAT009	Coloration AFB
LAT010	Ponction lombaire/examen du LCR
LAT011	Test antigénique cryptococcique sérique (CRAG)
LAT012	Culture bactériologique et test de sensibilité aux antibiotiques
LAT013	Examen d'urine
LAT014	Numération différentielle des globules blancs
LAT015	Test de dépistage de l'antigène de surface de l'hépatite B (HBsAg)
LAT016	Alanine transaminase hépatique
LAT017	aspartate transaminase hépatique
LAT018	Créatinine sérique
LAT019	Échantillon d'urine du milieu de jet (MSU)
LAT020	test d'anticorps contre la dengue
LAT021	test d'anticorps contre la fièvre jaune
LAT022	Examen des selles
LAT023	préparation de l'encre de Chine
LAT024	LCR pour les protéines
LAT025	Test de dépistage des anticorps contre l'hépatite A
LAT026	Nombre de CD4
LAT027	LCR pour le glucose
LAT028	Hémoculture
LAT029	tests d'agglutination au latex rapides

	Hématologie
	globules blancs
LHW001	Morphologie normale des globules blancs
LHW002	Neutropénie
LHW003	Neutrophilie
LHW004	Neutrophiles hypersegmentés/déviation à droite
LHW005	Neutrophiles en bande/Déviation à gauche
LHW006	Granulations toxiques/vacuolisation (neutrophiles)
LHW007	Cytoplasme hypogranulaire/agranulaire (neutrophiles)
LHW008	Lymphocytose
LHW009	Lymphopénie
LHW010	Lymphocytes réactifs/Lymphocytes atypiques
LHW011	Monocytose
LHW012	Éosinophilie
LHW013	Basophilie
LHW014	Cellules blastiques
LHW015	Promyélocytes
LHW016	Myélocytes
LHW017	Polymphocytes
LHW018	Tiges Auer

	globules rouges
LHR001	Globules rouges normocytaires, normochromes
LHR002	Hypochromie
LHR003	Polychromasie
LHR004	Microcytose
LHR005	Anisocytose
LHR006	poikilocytose
LHR007	globules rouges nucléés
LHR008	Cellules crayon
LHR009	Macrocytes
LHR010	macrocytes ovales
LHR011	Cellules cibles
LHR012	Échinocytes/cellules crénelées
LHR013	Drépanocytose
LHR014	Acanthocytes
LHR015	Schistocytes/Fragments de globules rouges
LHR016	Dacrocytes/Cellules en forme de goutte lacrymale
LHR017	Sphérocytes

	Plaquettes
LHP001	Plaquettes en quantité suffisante et de morphologie normale
LHP002	Thrombocytopénie
LHP003	Thrombocytose
LHP004	Agglomération plaquettaire
LHP005	Anisocytose plaquettaire
LHP006	plaquettes géantes

	Hémoglobine
LHH001	Hb 11 g/dL
LHH002	Refaire un dosage d'hémoglobine après 2 semaines
LHH003	Hb 18 g/dL
LHH004	Refaire un dosage d'hémoglobine après 1 mois
LHH005	Hb 13 g/dL
LHH006	Mesure de l'hémoglobine
LHH007	Hb 12 g/dL

	parasites sanguins
LBP001	Frottis sanguin pour la recherche de parasites du paludisme
LBP002	Parasites du paludisme observés
LBP003	<i>Plasmodium falciparum</i>
LBP004	<i>Plasmodium malariae</i>
LBP005	<i>Plasmodium ovale</i>
LBP006	<i>Plasmodium vivax</i>
LBP007	Détection des parasites
LBP008	<i>Leishmania donovani</i>
LBP009	Trypanosomes observés
LBP010	Les érythrocytes infectés peuvent contenir des points de Ziemann.
LBP011	Les trophozoïtes sont compacts
LBP012	<i>Borrelia</i> spp
LBP013	Certains trophozoïtes s'étirent comme des bandes à travers le globule rouge.
LBP014	Microfilières observées
LBP015	Les érythrocytes infectés sont de taille normale ou légèrement plus petite.
LBP016	Détection d'anomalies hématologiques, par exemple une neutrophilie
LBP017	Les gamétocytes sont ronds, compacts, avec des pigments foncés éparés.
LBP018	Pour l'identification des espèces
LBP019	Détection d'autres parasites sanguins
LBP020	Aucun parasite sanguin observé
LBP021	Quantification des parasites dans les infections à forte densité

	sécurité en laboratoire
LSF001	Utilisez une armoire de sécurité en bon état de fonctionnement.
LSF002	Utiliser un système de collecte de sang fermé
LSF003	Suivre le système d'emballage triple
LSF004	Communiquer avec le laboratoire de référence lors de l'envoi d'un échantillon.
LSF005	Toujours verser l'acide concentré dans l'eau, et non l'inverse. Ajouter toujours l'acide concentré à l'eau, et non l'eau à l'acide.
LSF006	Conservez des conteneurs à code couleur pour l'élimination des déchets biologiques dangereux et autres matériaux.
LSF007	Informez le responsable de la sécurité et consignez l'incident dans le registre des incidents.
LSF008	Prodiguer les premiers soins : laisser la plaie saigner librement sans la presser et la laver à l'eau et au savon.
LSF009	Utilisation de bonnes pratiques de biosécurité
LSF010	Utilisez toujours les dispositifs de protection individuelle
LSF011	Respectez l'hygiène des mains

	impression de diagnostic de laboratoire
LDI001	hémogramme normal
LDI002	Anémie hémolytique
LDI003	Anémie ferriprive
LDI004	anémie mégaloblastique
LDI005	Anémie des maladies chroniques
LDI006	Photo post-splénectomie

RÉPONSES CLINIQUES

	Traitement des infections parasitaires
CTP001	Amodiaquine 3 comprimés par jour pendant 3 jours
CTP002	Artéméter-luméfantrine (AL) : 6 doses sur 3 jours, en fonction du poids corporel.
CTP003	Artésunate : Amodiaquine : 3 doses sur 3 jours, en fonction du poids corporel
CTP004	Chloroquine 600 mg (dose de base), 300 mg 6 heures plus tard, puis 300 mg par jour
CTP005	Comprimés de quinine (600 mg de sel) toutes les 8 heures pendant 7 jours
CTP006	Primaquine 15 mg une fois par jour pendant 14 jours
CTP007	Albendazole 400 mg une fois par jour pendant 3 jours
CTP008	Mébéndazole 100 mg deux fois par jour pendant 3 jours
CTP009	Lévamisole 2,5 mg/kg en dose unique : peut être renouvelée
CTP010	Praziquantel 40 mg/kg par voie orale en une seule prise ou en doses fractionnées
CTP011	Métrifonate 10 mg/kg x 3 doses, à 2 - 4 semaines d'intervalle
CTP012	Diéthylcarbamazine (DEC) 0,5 mg/kg en dose unique le jour 1, 0,5 mg/kg trois fois par jour
CTP013	Ivermectine 150 - 200 µg/kg dose unique
CTP014	Suramine 1 g par voie intraveineuse avant la ponction lombaire
CTP015	Sulfadoxine-pyriméthamine (SP) 3 comprimés stat

	Traitement de l'anémie
CTA001	Sulfate ferreux 200 mg trois fois par jour jusqu'à stabilisation du taux d'hémoglobine à un niveau normal, puis pendant 2 à 3 mois supplémentaires.
CTA002	Sulfate ferreux 6 mg/kg (fer élémentaire) jusqu'à stabilisation du taux d'hémoglobine à un niveau normal, puis pendant 2 à 3 mois supplémentaires.
CTA003	Acide folique 2,5 mg par jour jusqu'à ce que le taux d'hémoglobine se stabilise à un niveau normal, puis pendant un mois supplémentaire.
CTA004	Acide folique 5 mg par jour jusqu'à ce que le taux d'hémoglobine se stabilise à un niveau normal, puis pendant un mois supplémentaire.
CTA005	Rechercher la cause de l'anémie
CTA006	Demander une transfusion sanguine

	Diagnostics
CLD001	Syphilis
CLD002	Syphilis primaire
CLD003	Infection par le VIH
CLD004	Cancer de l'intestin
CLD005	Schistosomiase
CLD006	Syphilis secondaire
CLD007	Anémie sévère
CLD008	Insuffisance rénale aiguë
CLD009	Tuberculose péritonéale
CLD010	Infection des voies urinaires (IVU)
CLD011	Infection des voies respiratoires
CLD012	Infections parasitaires
CLD013	Septicémie méningococcique
CLD014	fièvre typhoïde
CLD015	Infections virales
CLD016	COVID 19
CLD017	Allergies alimentaires
CLD018	fièvre hémorragique virale
CLD019	paludisme cérébral
CLD020	Hépatite B
CLD021	Paludisme
CLD022	Vers intestinaux
CLD023	Troubles de la moelle osseuse
CLD024	Infections systémiques, par exemple la leishmaniose, la trypanosomiase
CLD025	Maladies chroniques, par exemple maladies rénales, maladies auto-immunes, arthrite, maladies hépatiques, maladies pulmonaires, maladies cardiaques
CLD026	Tumeurs malignes
CLD027	Insuffisance rénale aiguë
CLD028	fissure anale
CLD029	Anémie maternelle
CLD030	Vivre en haute altitude
CLD031	Hépatite A
CLD032	Infection à levures/fongiques
CLD033	Ulcère peptique
CLD034	Anémie falciforme
CLD035	Hémorroïdes
CLD036	Intoxication alimentaire
CLD037	Tuberculose extrapulmonaire
CLD038	Infection entérique avec <i>Escherichia coli</i> , <i>Clostridium jejuni</i> , <i>Shigella</i> spp. ou Salmonellespp.
CLD039	Infections bactériennes
CLD040	méningite bactérienne

	Traitement des infections bactériennes, virales et fongiques
CTB001	Pénicilline V 250 mg quatre fois par jour pendant 5 à 7 jours
CTB002	Pénicilline V 500 mg quatre fois par jour pendant 5 à 7 jours
CTB003	Pénicilline procaine 600 000 unités IM par jour pendant 10 jours
CTB004	Ovules vaginaux de miconazole, 200 mg pendant 3 nuits
CTB005	Comprimé vaginal de clotrimazole, 100 mg pendant 7 nuits
CTB006	Amoxicilline 125 mg/5 mL trois fois par jour pendant 5 à 7 jours
CTB007	Amoxicilline 250 mg trois fois par jour pendant 5 à 7 jours
CTB008	Amoxicilline 500 mg trois fois par jour pendant 5 à 7 jours
CTB009	Amoxicilline/acide clavulanique 375 mg deux fois par jour pendant 5 à 7 jours
CTB010	Amoxicilline/acide clavulanique 625 mg deux fois par jour pendant 5 à 7 jours
CTB011	Sirop d'amoxicilline/acide clavulanique 457 mg deux fois par jour pendant 5 à 7 jours
CTB012	Ampicilline/cloxacilline 250 mg/5 mL par voie orale quatre fois par jour pendant 5 à 7
CTB013	Ampicilline/cloxacilline 500 mg par voie orale quatre fois par jour pendant 5 à 7 jours
CTB014	Sirop d'érythromycine 125 mg/5 mL quatre fois par jour pendant 5 à 7 jours
CTB015	Sirop d'érythromycine 125 mg/5 mL quatre fois par jour pendant 14 jours
CTB016	Erythromycine 250 à 500 mg quatre fois par jour par voie orale pendant 5 à 7 jours
CTB017	Erythromycine 250 à 500 mg quatre fois par jour par voie orale pendant 14 jours
CTB018	Céfuroxime 125 mg deux fois par jour par voie orale pendant 5 à 7 jours
CTB019	Céfuroxime 250 mg deux fois par jour par voie orale pendant 5 à 7 jours
CTB020	Ceftriaxone 250 mg IM en dose unique
CTB021	Ceftriaxone 50 mg/kg deux fois par jour par voie IM/IV pendant 10 à 14 jours
CTB022	Ceftriaxone 250 mg IM deux fois par jour pendant 5 à 7 jours
CTB023	Cotrimoxazole 480 mg, 2 comprimés deux fois par jour pendant 5 jours
CTB024	Sirop de cotrimoxazole 240 mg deux fois par jour pendant 5 à 7 jours
CTB025	Norfloxacine 400 mg deux fois par jour pendant 3 jours
CTB026	Norfloxacine 800 mg en dose unique
CTB027	Ciprofloxacine 500 mg en dose unique
CTB028	Ciprofloxacine 500 mg deux fois par jour pendant 5 jours
CTB029	Tétracycline 500 mg quatre fois par jour pendant 7 jours
CTB030	Tétracycline 500 mg quatre fois par jour pendant 15 jours
CTB031	Doxycycline 100 mg deux fois par jour pendant 7 jours
CTB032	Spectinomycine 2 g IM en dose unique
CTB033	Débuter le traitement par Ziduvine/Stavudine et Lamivudine deux fois par jour dans un délai de 72 heures pendant 28 jours (Prophylaxie post-exposition - PEP)
CTB034	Traitement intensif de la tuberculose
CTB035	Phase de continuation du traitement de la tuberculose
CTB036	Pommade ophtalmique à la tétracycline à 1 %, 3 fois par jour pendant 10 jours
CTB037	Débuter un traitement antirétroviral
CTB038	Pénicilline benzathine 2,4 µg/L
CTB039	Pénicilline benzathine 2,4 µg par semaine pendant 2 semaines
CTB040	Fluconazole 150 mg dose unique
CTB041	Débuter l'administration d'antibiotiques systémiques
CTB042	Nystatine, comprimé vaginal de 200 000 unités pendant 7 nuits

	Traitement symptomatique
CTS001	Acide acétylsalicylique (aspirine) 300 mg toutes les 4 à 6 heures au besoin
CTS002	Paracétamol 500 mg toutes les 4 à 6 heures au besoin
CTS003	Sirop de paracétamol 125 mg/5 mL toutes les 4 à 6 heures, au besoin
CTS004	Sirop de paracétamol 250 mg/5 mL toutes les 4 à 6 heures, au besoin
CTS005	Chlorphéniramine 4 mg trois fois par jour pendant 7 jours, ou au besoin
CTS006	Prométhazine 5 mg/5 mL trois fois par jour, ou au besoin
CTS007	Prométhazine 25 mg trois fois par jour, ou au besoin
CTS008	Buscopan (bromure de butylhyoscine) 10 mg trois fois par jour
CTS009	Réhydratation - orale ou intraveineuse
CTS010	Buvez beaucoup de liquides
CTS011	Buscopan (bromure de butylhyoscine) 10 mg trois fois par jour
CTS012	Gestion de la douleur par les opioïdes
CTS013	Nettoyage et pansement des plaies - deux fois par jour

	Imagerie médicale
CMIO01	Radiographie thoracique
CMIO02	échographie abdominale
CMIO03	Coloscopie
CMIO04	Gastroscopie

RÉPONSES EN MATIÈRE DE SANTÉ PUBLIQUE / DE CONTRÔLE DES INFECTIONS

PHC001	campagnes de sensibilisation du public
PHC002	Renseignez-vous sur l'endémicité des maladies dans le pays.
PHC003	Femelle <i>Anophele</i> moustique
PHC004	Moustiques
PHC005	Femelle <i>Culex</i> moustique
PHC006	Femelle <i>Aedes</i> moustique
PHC007	<i>Phlébotome</i> spp
PHC008	<i>Glossine</i> spp
PHC009	Réponse appropriée à l'épidémie
PHC010	poux du corps
PHC011	lavez-vous soigneusement les mains lorsque vous manipulez ou préparez des aliments.
PHC012	Surveillance renforcée
PHC013	Recherche, dépistage et suivi des contacts
PHC014	Tests/dépistage des partenaires
PHC015	Lavez soigneusement les fruits et légumes.
PHC016	Dépistage et traitement de masse
PHC017	administration massive de médicaments
PHC018	Commencez le traitement rapidement
PHC019	Consommez des aliments cuits et servis chauds.
PHC020	Supplémentation quotidienne en fer et en acide folique pendant la grossesse
PHC021	Traitement préventif intermittent (du paludisme) pendant la grossesse (TPIp)
PHC022	Évitez tout contact cutané avec un sol potentiellement contaminé.
PHC023	chimioprophylaxie
PHC024	Programmes de vaccination antipneumococcique
PHC025	Programmes de vaccination contre le méningocoque
PHC026	Gardez la viande crue à l'écart des autres aliments et des ustensiles propres.
PHC053	Dépistage néonatal dans les établissements de soins de santé primaires
PHC054	Dépistage prénatal chez les femmes enceintes

PHC027	Informez les autorités sanitaires locales
PHC028	Couvrez votre bouche et votre nez lorsque vous toussiez ou éternuez.
PHC029	Évitez les zones encombrées ; restez dans des endroits bien aérés.
PHC030	Maintenez toujours une distance suffisante lorsque vous aidez un patient à prélever un
PHC031	Lavez-vous fréquemment les mains avec du savon et de l'eau.
PHC032	Utilisation de préservatifs/rapports sexuels protégés
PHC033	abstinence sexuelle
PHC034	Conseil
PHC035	Évitez de partager les aiguilles.
PHC036	Vêtements longs après le coucher du soleil
PHC037	Utilisez les latrines ou les toilettes pour une évacuation sanitaire adéquate
PHC038	Buvez de l'eau bouillie ou chlorée
PHC039	Évitez d'uriner ou de déféquer près des plans d'eau douce.
PHC040	Évitez de vous baigner ou de patauger dans les rivières, les piscines, les lacs ou autres
PHC041	Se baigner dans de l'eau conservée pendant 1 à 2 jours
PHC042	Éliminer les escargots vivant dans l'eau
PHC043	adhésion au TAR
PHC044	N'utilisez pas les excréments humains comme engrais.
PHC045	Évitez de marcher pieds nus à l'extérieur
PHC046	Explorez les options d'alimentation
PHC047	Utilisation de moustiquaires imprégnées d'insecticide (mim) ou de moustiquaires
PHC048	Insecticides : sprays, spirales, répulsifs
PHC049	Pulvérisation résiduelle à l'intérieur des habitations (IRS)
PHC050	Éliminer l'eau stagnante
PHC051	Utilisation de larvicides
PHC052	Pièges à mouches tsé-tsé
PHC055	Sensibilisation communautaire et éducation à la santé
PHC056	Former les professionnels de la santé à la détection précoce et à la prise en charge.